

Problème clinique ou de diagnostic	Examen	Recommandations (Niveau)	Dose	Commentaires
<b>Patientes asymptomatiques présentant un risque modéré de carcinome mammaire</b>				
<b>M01. Dépistage chez les femmes de moins de 40 ans</b>	Mammographie	Non indiqué [B]	⊕	Il n'est pas recommandé de réaliser une mammographie de dépistage chez les femmes de moins de 40 ans.
<b>M02. Dépistage chez les femmes de 40 ans et plus</b>	Mammographie	Indiqué [A]	⊕	
<b>Patientes symptomatiques</b>				
<b>M03 Suspicion clinique de carcinome</b>	Mammographie	Indiqué [B]	⊕	La mammographie est l'examen de premier abord à utiliser chez les femmes de plus de 30 ans.
	ÉCHO	Indiqué seulement dans des cas précis [B]	0	L'échographie est la technique d'imagerie de première intention à utiliser pour l'évaluation de masses palpables chez les femmes de moins de 30 ans et chez les femmes enceintes et en période d'allaitement.  En tant qu'examen d'appoint à la mammographie, l'échographie joue un rôle important dans l'évaluation de masses palpables chez les femmes présentant des tissus mammaires denses sur clichés mammographiques.  L'échographie peut servir d'examen d'imagerie de première intention chez les femmes soulevant une nouvelle préoccupation clinique, mais ayant obtenu des résultats normaux à une mammographie récente.
	IRM	Indiqué seulement dans des cas précis [B]	0	L'IRM peut être indiquée pour évaluer le stade initial d'une tumeur avérée. Elle peut également être indiquée lorsque les autres techniques d'imagerie présentent des résultats non concluants.
<b>M04. Suspicion de maladie de Paget</b>	Mammographie	Indiqué [C]	⊕	La mammographie révèle une anomalie chez 50 % des femmes. Il peut être utile d'envisager le recours à une biopsie guidée par imagerie. S'il y a confirmation d'atteinte invasive, la prise en charge chirurgicale de l'aisselle devra en tenir compte.

Problème clinique ou de diagnostic	Examen	Recommandations (Niveau)	Dose	Commentaires
<b>M05. Écoulements mamelonnaires spontanés sanglants ou clairs</b>	Mammographie	Indiqué [C]	⊕	La mammographie est la modalité à privilégier pour l'évaluation des écoulements mamelonnaires.
	ÉCHO	Indiqué [C]	0	Il s'agit d'un examen supplémentaire important dans l'évaluation des écoulements mamelonnaires.
	Galactographie	Indiqué [C]	⊕	La galactographie est indiquée lorsque la mammographie et l'échographie présentent des résultats non concluants.
	IRM	Indiqué seulement dans des cas précis [C]	0	L'IRM est indiquée lorsque tous les autres examens présentent des résultats non concluants.
<b>M06. Évaluation de l'intégrité d'un implant mammaire</b>	Mammographie	Indiqué [C]	⊕	La mammographie peut déceler les ruptures extracapsulaires.
	ÉCHO	Indiqué [B]	0	L'échographie peut déceler les ruptures intracapsulaires et extracapsulaires.
	IRM	Examen spécialisé [B]	0	Modalité la plus sensible pour documenter la rupture d'un implant.
<b>M07. Inflammation du sein</b>	Mammographie	Examen spécialisé [C]	⊕	En cas de doute clinique, la mammographie peut exclure la présence de signes mammographiques indicateurs de malignité.
	ÉCHO	Indiqué seulement dans des cas précis [C]	0	Utile pour détecter un éventuel abcès, réaliser une aspiration échoguidée et effectuer un suivi.
<b>M08. Suivi d'un cancer du sein (surveillance)</b>	Mammographie	Indiqué [A]	⊕	Il est approprié de réaliser une mammographie chaque année, en plus d'un examen clinique du sein.